

RESULTADO ECR VARIEDADES DE SOJA 2021/22


GENERALIDADES

El marco de la RIDZO (Red de innovación y desarrollo de la Zona Oeste), el presente informe describe los resultados de la red de ensayos comparativos de rendimientos de variedades de soja de la Zona Oeste del movimiento CREA.

CARACTERÍSTICAS DE LA LÍNEA DE ENSAYO

- 8 ENSAYOS DE MACRO PARCELAS CON REPETICIÓN
- 1 TESTIGO CADA 4 MATERIALES (ambiental)
- 19 VARIEDADES EVALUADAS
- MANEJO DEL PRODUCTOR

Se sembraron 8 ensayos de Soja 1°; uno se descartó por deriva de herbicida y de los 7 cosechados, 2 se descartaron por alta variabilidad del testigo ambiental. A continuación se presenta el mapa de los sitios ensayados con sus características:



SITIO	LA MARGARITA	BUENA ESPERANZA	CARLOS DON VICENTE	LA FRONTERA	SAN JORGE	HUAQUENES	LA VIZCACHERA	SAN PEDRO	PROMEDIO
Localidad	Alvaríño	Pasteur	C. Casares	Alvaríño	Salazar	R. J. Neild	Ameghino	Roberts	-
FDS	9-nov.	9-nov.	12-nov.	10-nov.	7-nov.	19-nov.	26-nov.	8-nov.	12-nov.
FDC	19-abr.	8-abr.	18-abr.	16-abr.	15-abr.	8-may.	18-abr.	-	18-abr.
RINDE	5,481	5,370	5,149	5,023	4,764	4,731	3,765	-	4,898
CV% Test.	4.6%	12.0%	10.4%	5.0%	5.5%	3.8%	18.5%	-	8.5%

Las variedades ensayadas son las siguientes:

Nº	SEMILLERO	VARIEDAD
1	Basf credenz	CZ 3621 STS
2	Basf credenz	CZ 3823 STS
3	Basf credenz	CZ 4021 STS
4	Basf credenz	CZ 4721 STS
5	Nidera	NS 3821 STS
6	Nidera	NS 4642 STS
7	Don Mario	DM 40R21 STS
8	Don Mario	DM 46E21 STS
9	Illinois	IS 38.2 SE
10	Illinois	IS 46.2 RR STS
11	Illinois	IS 48.2 E
12	Neogen	NEO 40S22 SE
13	Neogen	NEO 45S22 RR STS
14	Neogen	NEO 46S22 SE
15	NK	NK 39x22 STS
16	NK	NK 51x22 IPRO STS
17	NK	NK 52X21 STS
18	Pioneer	P43A04SE
19	Pioneer	P46A03SE

Cuadro n°1: Variedades participantes en la campaña 2021/22.

ANÁLISIS DE RESULTADOS

RESULTADOS GENERALES

El rinde promedio de los sitios analizados es de 50 qq/ha con un rango de 38 a 55 qq/ha. Para el análisis de rendimiento no se consideraron La Vizcachera y Buena Esperanza por su variabilidad elevada. A continuación se presenta el resumen de las diferencias promedio obtenidas por cada variedad respecto a la media:





Gráfico 1: Diferencias respecto a la media por variedad Soja para la red 2021-22. Letras entre paréntesis representa diferencias significativas para un modelo DGC con $\alpha=0.05$.

ANÁLISIS DE VARIANZA

Se realizó análisis de varianza (Modelo DGC; $\alpha=0.05$) y se diferenciaron significativamente 3 grupos de materiales. Los A con 55 a 57 qq/ha, los B con 47 a 54 qq/ha y C con 44 qq/ha.



Análisis de la varianza

Variable	N	R ²	R ² Aj	CV
RINDE	91	0.61	0.48	7.54

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo I)

F.V.	SC	gl	CM	F	p-valor
Modelo	14986932.85	22	681224.22	4.74	<0.0001
VARIEDAD	8644129.02	18	480229.39	3.34	0.0002
SITIO	6342803.83	4	1585700.96	11.03	<0.0001
Error	9773986.82	68	143735.10		
Total	24760919.67	90			

Test:DGC Alfa=0.05 PCALT=515.5999

Error: 143735.1003 gl: 68

VARIEDAD	Medias	n	E.E.	
NEO 40S22 SE	5704.25	4	189.56	A
DM 40R21 STS	5556.40	5	169.55	A
NS 3821 STS	5370.00	5	169.55	B
IS 38.2 SE	5267.20	5	169.55	B
NEO 45S22 RR STS	5221.60	5	169.55	B
DM 46E21 STS	5212.60	5	169.55	B
CZ 3823	5125.20	5	169.55	B
CZ 4721 STS Enlist	5113.40	5	169.55	B
IS 46.2 RR STS	5041.20	5	169.55	B
P43A04SE	4933.75	4	189.56	B
NEO 46S22 SE	4933.00	5	169.55	B
P46A03SE	4913.00	4	189.56	B
NK 39x22 STS	4885.60	5	169.55	B
CZ 4021 STS	4875.20	5	169.55	B
IS 48.2 E	4871.00	5	169.55	B
NK 51x22 IPRO STS	4725.80	5	169.55	B
NS 4642 STS	4722.75	4	189.56	B
CZ 3621 STS	4697.40	5	169.55	B
NK 52X21 STS	4356.40	5	169.55	C

Medias con una letra común no son significativamente diferentes ($p > 0.05$)

PESO DE MIL GRANOS

Además del rendimiento, se realizaron mediciones de peso de mil granos (PMG):

VARIEDAD	RINDE PROM.	PMG MAX.	PMG PROM.	PMG MÍN.
NEO 400 SE	5,704	→ 172	→ 162	↑ 160
DM 40R21 STS	5,556	↑ 185	↑ 169	↑ 160
NS 3821 STS	5,370	→ 170	→ 158	→ 143
IS 38.2 SE	5,267	→ 170	→ 160	→ 140
NEO 460 RR STS	5,221	↑ 185	↑ 167	↑ 153
DM 46E21 STS	5,213	→ 165	↓ 139	↓ 123
CZ 3823 STS	5,125	↑ 188	↑ 183	↑ 168
CZ 4721 STS	5,113	↑ 196	↑ 168	→ 133
IS 46.2 RR STS	5,041	↑ 185	↑ 177	↑ 170
P43A04SE	4,934	↓ 155	↓ 141	↓ 127
NEO 460 SE	4,933	↓ 158	↓ 138	↓ 107
P46A03SE	4,913	↓ 145	↓ 136	↓ 117
NK 39x22 STS	4,885	↑ 184	↑ 169	↑ 150
CZ 4021 STS	4,875	↑ 185	↑ 175	↑ 160
IS 48.2 E	4,871	↓ 156	↓ 147	→ 133
NS 4642 STS	4,723	↑ 180	→ 158	↓ 124
NK 51x22 IPRO STS	4,726	→ 172	→ 159	→ 148
CZ 3621 STS	4,697	→ 175	→ 161	→ 144
NK 52X21 STS	4,356	↓ 145	↓ 140	→ 132
Total general	5,026	196	158	107

COMPARACIÓN INTERANUAL

Debido al gran recambio en el portfolio de los semilleros muy pocas variedades presentan participación en campañas anteriores.

VARIEDAD	2021/22		2020/21	2019-20	2018/19	2017/18
	Casos > 5%prom	RINDE REL.	RINDE REL.	RINDE REL.	RINDE REL.	RINDE REL.
NEO 400 SE	100%	111.7%	-	-	-	-
DM 40R21 STS	80%	110.1%	106%	-	-	-
NS 3821 STS	80%	106.8%	-	-	-	-
IS 38.2 SE	20%	104.7%	-	-	-	-
DM 46E21 STS	40%	103.8%	-	-	-	-
NEO 460 RR STS	20%	103.6%	-	-	-	-
CZ 3823 STS	20%	102.0%	-	-	-	-
CZ 4721 STS	40%	101.6%	95%	-	-	-
IS 46.2 RR STS	20%	100.4%	-	-	-	-
P43A04SE	50%	100.3%	-	-	-	-
P46A03SE	25%	100.1%	-	-	-	-
NEO 460 SE	20%	98.2%	-	-	-	-
NK 39x22 STS	40%	97.6%	-	-	-	-
CZ 4021 STS	40%	97.3%	-	-	-	-
IS 48.2 E	0%	96.8%	-	-	-	-
NK 51x22 IPRO STS	0%	93.9%	-	-	-	-
CZ 3621 STS	0%	93.2%	-	-	-	-
NS 4642 STS	0%	92.6%	-	-	-	-
NK 52X21 STS	0%	86.4%	-	-	-	-
PROMEDIO	-	100%	-	-	-	-

CONCLUSIONES:

- Se diferenciaron significativamente los GM III largos y IV cortos por sobre los más largos
- En el análisis general se diferenciaron estadísticamente 3 grupos de variedades:
 - **A (55-57qq/ha):** Neo 40S22 SE y DM 40R21 STS.
 - **B (47-54qq/ha):** NS 382 STS; IS 38.2 SE; Neo 45S22 RRSTS; DM 46E21 STS; CZ 3823; CZ 4721 STS; IS 46.2 RR STS; P 43A04SE; Neo 46S22 SE; P 46A03 SE; NK 39x22 STS; CZ 4021 STS; IS 48.2 E; NK 51x22 STS; NS 4642 STS y CZ 3621 STS
 - **C (43 qq/ha):** NK 52x21 STS
- Analizando las variedades de **GM III L y IV C**, se diferencian 2 grupos:
 - **A (51-57qq/ha):** Neo 40S22 SE, DM 40R21 STS, NS 3821 STS y IS 38.2 SE.
 - **B (47-49qq/ha):** NK 39x22 STS, CZ 4021 STS y CZ 3621 STS
- Analizando las variedades de **GM IV M y V C**, hubo poca diferenciación de variedades:
 - **A (47-52qq/ha):** Neo 45S22 RR STS, DM 46R21 STS, CZ 4721 STS; IS 46.2 RR STS; P43A04SE; Neo 46S22 SE; P43A03SE; IS 48.2 E; NK 51x22 IPRO STS y NS 4642 STS.
 - **B (43qq/ha):** NK 52x21 STS.

Agradecimientos:

- A las empresas CREA y sus equipos de trabajo por su excelente predisposición en todo:
 - San Jorge – Invagro SA
 - Buena Esperaza - Cruz Agrasar
 - La Vizcachera - Familia Keene
 - Huaquenes – Familia Egaña
 - La Frontera - Sastre Inchauspe
 - San Pedro - Cañada Honda SA
 - La Margarita - Familia Algorta
 - Carlos Don Vicente - Tomás Hnos
- A las empresas comerciales: Don Mario, Illinois, Neogen, Nidera, Basf Credenz, Pioneer y NK por acompañarnos en este proyecto.
 - A los ensayistas por su compromiso:
 - René Martineau
 - Adolfo Palancar
 - Sebastián Herrero Laporte
 - Nicolás Bompadre
 - Jorge Sansot