




RED NACIONAL
DE MONITOREO
Dalbulus maidis

INFORME N° 23

29 de julio de 2025



29 DE JULIO DE 2025

RED NACIONAL DE MONITOREO
Dalbulus maidis

Red Nacional de trampas de monitoreo de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*)

INFORME N°23
05 de julio al 25 de julio de 2025.

En este vigésimo tercer informe se relevaron en total 338 localidades de la Argentina, distribuidas en las regiones del NOA (59 localidades), NEA (49 localidades), Litoral (34 localidades), Centro Norte (59 localidades), Centro Sur (137 localidades) como se detalla en la Figura 1. En este informe también a partir de la categoría de más de 100 adultos se establecieron nuevas categorías, considerándose a los valores de 101 a 500 adultos por trampa, 501 a 1000 y más de 1000 adultos capturados por trampa (Figura 1 y 2).

En este informe el período de exposición de las trampas fue más prolongado en comparación a informes anteriores, extendiéndose de 5 al 25 de julio, para contemplar el primer año de la Red Nacional de trampas de monitoreo de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*).

Durante el periodo comprendido entre el 5 y el 25 de julio, la ocurrencia de heladas fue muy bajas lo que mostró un comportamiento variable según la región.

En el NOA, se registró un incremento de los valores de captura correspondiente a la categoría de más de 100 adultos por trampa. Esta situación puede haber estado influenciada por la cosecha del maíz y la movilidad de la plaga, favoreciendo la captura de los adultos presentes en el cultivo. En algunas localidades de esta región, se registraron únicamente dos heladas (los días 17 y 18 de julio), de carácter puntual, baja intensidad (temperaturas levemente inferiores a -1°C) y corta duración (alrededor de una hora) ^[1]. A diferencia de la quincena anterior, en la que las heladas más severas impactaron directamente sobre las poblaciones del vector, estos eventos suaves no lograron modular su dinámica (Figuras 2, 3 y 4). ^[1] (EEAOC) Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres. Sistema Agrometeorológico. Disponible en: <https://agromet.eeaoc.gob.ar/>

En el NEA, solo se reportaron heladas puntuales en Chaco y Santiago del Estero el 18 de julio, con mínimas inferiores a -2°C y duración inferior a una hora ^[2]. La mayoría de las localidades no registró heladas en este período, A pesar de ello, se observó una disminución en las categorías más altas de captura (más de 100 adultos por trampa), aunque a población general de *Dalbulus maidis* se mantuvo estable en términos generales (Figuras 2, 5 y 6). ^[2]Fuente: <https://siga.inta.gob.ar/#/>

La información detallada en este informe está sujeta a modificaciones que podrían surgir al momento de las auditorías de las trampas cromáticas adhesivas realizadas por las instituciones coordinadoras de la Red Nacional de Monitoreo de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) para asegurar la trazabilidad de las mismas.

En el Litoral, las heladas fueron prácticamente inexistentes. Los registros más bajos apenas alcanzaron los 0 °C en algunas localidades de Entre Ríos, de forma puntual y poca duración ^[2]. En este contexto, la dinámica poblacional se mantuvo mayormente estable en relación con el informe anterior, aunque se detectó un leve incremento en la categoría de presencia (1 a 4 adultos por trampa), producto de la disminución de las categorías más elevadas, en esta zona agroecológica (Figuras 2, 7 y 8). ^[2]Fuente: <https://siga.inta.gob.ar/#/>

En la región Centro-Norte, tras las intensas heladas reportadas anteriormente —con registros de hasta -8,6 °C—, no se observaron nuevos eventos relevantes, salvo en algunas localidades puntuales con mínimas de baja intensidad y corta duración. En general, las temperaturas se mantuvieron por encima de los 4–6 °C, aunque se registró un marcado descenso térmico los días 23 y 24, con máximas cercanas a los 11 °C ^[2]. Esta estabilidad térmica permitió sostener la retracción poblacional del vector: las categorías altas e intermedias prácticamente no registraron capturas, y aumentó el número de localidades sin presencia de *D. maidis* (Figuras 2, 9 y 10). ^[2]Fuente: <https://siga.inta.gob.ar/#/>

En el Centro-Sur, se observó una tendencia similar. Las heladas intensas y persistentes previamente registradas en localidades del sur de Córdoba, Buenos Aires, La Pampa y San Luis fueron sucedidas por nuevos eventos los días 23 y 24, con mínimas que alcanzaron al menos -3 °C ^[2]. Aunque de menor intensidad que las anteriores, estas heladas resultaron suficientes para mantener las poblaciones del vector en niveles bajos, con un claro predominio de localidades sin presencia (Figuras 2, 11 y 12). ^[2]Fuente: <https://siga.inta.gob.ar/#/>

Es fundamental mantener el monitoreo de adultos de *D. maidis* durante todo el año, incluso en períodos de bajas temperaturas. Aunque las heladas reducen su actividad, actúan como moduladores de su dinámica poblacional, generando fluctuaciones que deben ser registradas para entender su comportamiento estacional en las distintas regiones maiceras. Esta información es clave para una toma de decisiones más precisa y oportuna.

El uso de trampas cromáticas debe complementarse con inspecciones visuales y muestreo con red entomológica, especialmente en cultivos invernales, de servicio y malezas, donde los adultos tienden a refugiarse en el estrato inferior. Esta combinación de herramientas mejora la detección en condiciones adversas y permite caracterizar con mayor exactitud la dinámica del vector a lo largo del año.

La información detallada en este informe está sujeta a modificaciones que podrían surgir al momento de las auditorías de las trampas cromáticas adhesivas realizadas por las instituciones coordinadoras de la Red Nacional de Monitoreo de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) para asegurar la trazabilidad de las mismas.

Por otro lado, cabe recordar que durante el período otoñal-invernal los adultos de *D. maidis* tienden a modificar su coloración estacional. Los ejemplares estivales suelen presentar tonalidades más claras y brillantes, mientras que los adultos que emergen en otoño e invierno adquieren una coloración más oscura. Este aspecto debe considerarse para una correcta identificación del vector en las distintas épocas del año.

El cultivo de maíz nos presenta el desafío de implementar un Manejo Integrado de Plagas (MIP) más consciente, donde el monitoreo se convierte en un elemento crítico y estratégico para la toma de decisiones. El Manejo Integrado de *D. maidis* implica la combinación de prácticas de monitoreo y medidas para su control diseñadas para minimizar el impacto de las enfermedades causadas por los patógenos que este vector transmite al cultivo de maíz.

En el Anexo 1 se detallan las Instituciones que participan de la Red Nacional de trampas de monitoreo de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*), los objetivos perseguidos por la misma y aspectos referidos a la forma de visualizar la información obtenida de la Red.




Figura 1. Captura de adultos de *D. maidis*/trampa, en función de la escala establecida con tonalidad en la gama de azules para la 23° lectura (05/07 al 25/07).

La información detallada en este informe está sujeta a modificaciones que podrían surgir al momento de las auditorías de las trampas cromáticas adhesivas realizadas por las instituciones coordinadoras de la Red Nacional de Monitoreo de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) para asegurar la trazabilidad de las mismas.




Figura 2. Mapa de calor establecido en función de la evolución de la cantidad de adultos de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) capturados con trampas cromáticas adhesivas en las localidades relevadas desde el primer al vigésimo tercer informe de la Red Nacional de Monitoreo de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*).

La información detallada en este informe está sujeta a modificaciones que podrían surgir al momento de las auditorías de las trampas cromáticas adhesivas realizadas por las instituciones coordinadoras de la Red Nacional de Monitoreo de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) para asegurar la trazabilidad de las mismas.

Resumen Región Noroeste Argentino (NOA)




Figura 3. Resumen Región NOA. Se detalla el porcentaje de localidades según categorías correspondientes a la cantidad de adultos de la chicharrita del maíz capturados con trampas cromáticas adhesivas. 21° (03/06 al 19/06), 22° (20/06 al 04/07) y 23° Lectura (05/07 al 25/07).

Comentarios Región NOA

Se relevaron 57 localidades, de las cuales el 61 % se ubicó en la categoría de mayor abundancia, con más de 100 adultos por trampa (Figura 3). Este valor representa un incremento notable respecto al monitoreo anterior, lo que evidencia una recuperación poblacional del vector. Este repunte podría estar vinculado al avance de las cosechas y al incremento de las temperaturas, condiciones que favorecen la actividad y dispersión de *D. maidis*. Como resultado, las poblaciones del vector lograron reactivarse y expandirse, concentrándose los mayores niveles de captura principalmente en las provincias de Salta, Jujuy y Tucumán. Dentro del grupo de mayor abundancia, el 34 % de las localidades (equivalente a 12 sitios) superó las 500 capturas por trampa, lo que indica una concentración significativa de adultos en áreas específicas (Figuras 3 y 4).




Figura 4. Evolución del número promedio de capturas de *D. maidis* en la región NOA, según datos de los informes 21°, 22° y 23°.

Resumen Región Noreste Argentino (NEA)




Figura 5. Resumen Región NEA. Se detalla el porcentaje de localidades según categorías correspondientes a la cantidad de adultos de la chicharrita del maíz capturados con trampas cromáticas adhesivas. 21° (03/06 al 19/06), 22° (20/06 al 04/07) y 23° Lectura (05/07 al 25/07).

La información detallada en este informe está sujeta a modificaciones que podrían surgir al momento de las auditorías de las trampas cromáticas adhesivas realizadas por las instituciones coordinadoras de la Red Nacional de Monitoreo de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) para asegurar la trazabilidad de las mismas.

Comentarios Región NEA

Se realizaron relevamientos en 47 localidades, de las cuales el 25 % se ubicó en la categoría de mayor abundancia, con más de 100 adultos de *D. maidis* por trampa. Esta categoría estuvo representada principalmente en las provincias de Chaco y el norte de Santa Fe. Dentro de esta región, solo cuatro localidades (equivalente al 33 % de los sitios en dicha categoría) superaron las 500 capturas por trampa. Entre ellas, se destacó **Las Breñas** (Chaco) con el valor más alto registrado, alcanzando un total de 1.358 adultos. Este resultado señala un foco puntual de alta densidad poblacional, en un contexto general de presión moderada en la región (Figuras 5 y 6).




Figura 6. Evolución del número promedio de capturas de *D. maidis* en la región NEA, según datos de los informes 21°, 22° y 23°.

Resumen Región Litoral




Figura 7. Resumen Región Litoral. Se detalla el porcentaje de localidades según categorías correspondientes a la cantidad de adultos de la chicharrita del maíz capturados con trampas cromáticas adhesivas. 21° (03/06 al 19/06), 22° (20/06 al 04/07) y 23° Lectura (05/07 al 25/07).

Comentarios Región Litoral

En la región del Litoral se relevaron 34 localidades, y en este monitoreo no se registraron sitios dentro de la categoría de mayor abundancia (más de 100 adultos de *D. maidis* por trampa). La categoría más representativa fue la de baja presencia (1 a 4 adultos por trampa), que concentró el 35 % de los casos. En términos generales, la dinámica poblacional se mantuvo estable en comparación con el informe anterior. Se destacó el sitio de **Corrientes** (provincia homónima), con un registro de 89 adultos capturados, constituyéndose en un foco puntual dentro de un escenario regional caracterizado por baja densidad poblacional (Figuras 7 y 8).




Figura 8. Evolución del número promedio de capturas de *D. maidis* en la región LITORAL, según datos de los informes 21°, 22° y 23°.

Resumen Región Centro Norte




Figura 9. Resumen Región Centro Norte. Se detalla el porcentaje de localidades según categorías

La información detallada en este informe está sujeta a modificaciones que podrían surgir al momento de las auditorías de las trampas cromáticas adhesivas realizadas por las instituciones coordinadoras de la Red Nacional de Monitoreo de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) para asegurar la trazabilidad de las mismas.

correspondientes a la cantidad de adultos de la chicharrita del maíz capturados con trampas cromáticas adhesivas. 21° (03/06 al 19/06), 22° (20/06 al 04/07) y 23° Lectura (05/07 al 25/07).

Comentarios Región Centro Norte

De las 59 localidades relevadas, el 65 % presentó presencia de *D. maidis*. Entre los sitios con capturas, predominó la categoría de menor abundancia (entre 5 y 20 adultos por trampa), que representó el 34 % del total (20 localidades). En contraste, la categoría de mayor densidad (más de 100 adultos por trampa) mostró una disminución sostenida: del 37 % registrado hace un mes, bajó al 4 % en el informe anterior y al 2 % en el presente relevamiento. El valor más alto se registró en Emilia (Santa Fe), con 110 adultos por trampa, consolidándose nuevamente como el principal foco de la región (Figuras 9 y 10).




Figura 10. Evolución del número promedio de capturas de *D. maidis* en la región CENTRO NORTE, según datos de los informes 21°, 22° y 23°.

Resumen Región Centro Sur




Figura 11. Resumen Región Centro Sur. Se detalla el porcentaje de localidades según categorías correspondientes a la cantidad de adultos de la chicharrita del maíz capturados con trampas cromáticas adhesivas. 21° (03/06 al 19/06), 22° (20/06 al 04/07) y 23° Lectura (05/07 al 25/07).

Comentarios Región Centro Sur

De las 137 localidades relevadas, el 86 % no registró presencia de *D. maidis*, lo que consolida el efecto modulador de las heladas meteorológicas sobre la población del vector en el último mes. Solo 18 localidades (13 %) presentaron capturas, todas dentro de la categoría de presencia (1 a 5 adultos por trampa), reflejando una presión poblacional mínima en la región (Figuras 11 y 12).

La información detallada en este informe está sujeta a modificaciones que podrían surgir al momento de las auditorías de las trampas cromáticas adhesivas realizadas por las instituciones coordinadoras de la Red Nacional de Monitoreo de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) para asegurar la trazabilidad de las mismas.




Figura 12. Evolución del número promedio de capturas de *D. maidis* en la región CENTRO SUR, según datos de los informes 21°, 22° y 23°.

Región Noroeste Argentino (NOA)

Región NOA. Captura de adultos de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) con trampas cromáticas adhesivas. Se detalla el número de localidades (#Loc.), Institución responsable del monitoreo, provincia, localidad y el número de adultos *Dalbulus maidis*/trampa de la 21° (03/06 al 19/06), 22° (20/06 al 04/07) y **23° lectura correspondiente al periodo comprendido del 05 de julio al 25 de julio de 2025**. Los valores con el símbolo “✓” fueron sometidos a auditoría.

#Loc.	Institución	Provincia	Localidad	N° adultos <i>D. maidis</i> /trampa		
				21° Lectura	22° Lectura	23° Lectura
1	AAPRESID	Jujuy	Palpala	Sin datos	383	860
2	CREA	Jujuy	EL Carmen	7	2	15
3	CREA	Jujuy	Fraile Pintado	12	5	18 ✓
4	CREA	Jujuy	Santa Clara	43	19	24 ✓
5	INTA	Jujuy	El Bananal	675	244	587
9	AAPRESID	Salta	Rivadavia	368	32	1235
10	AAPRESID	Salta	Piquete Cabado 1	2680	1416	796
11	CREA	Salta	Antilla	945	Sin datos	Sin datos
12	CREA	Salta	Ballivián	112	32	360
13	CREA	Salta	Ceibalito	1520	113	Perdida
14	CREA	Salta	Chaguaral	0	0	Perdida
15	CREA	Salta	Copo Quiles	4320	Sin datos	Sin datos
16	CREA	Salta	El Bordo	2800	Sin datos	376
17	CREA	Salta	El Galpón	1007	669	227 ✓
18	CREA	Salta	El Tunal	957	Sin datos	Sin datos
19	CREA	Salta	Embarcación	39	32	42
20	CREA	Salta	Gral Pizarro	2240	20	Perdida
21	CREA	Salta	Horcones	260	31	130
22	CREA	Salta	J V Gonzales	2030	Perdida	47
24	CREA	Salta	Las Lajitas T3	1296	282	573
25	CREA	Salta	Metan 1	972	155	87
26	CREA	Salta	Metan 2	2564	804	846
27	CREA	Salta	Mollinedo	0	21	1350 ✓
28	CREA	Salta	Mosconi	19	7	34
29	CREA	Salta	Nstra Sra de Talavera	323	9	Perdida
30	CREA	Salta	Pichanal	59	2	280
31	CREA	Salta	Piquete Cabado 2	2300	363	1580
33	CREA	Salta	Santo Domingo	2320	448	1800
34	CREA	Salta	Saravia	1540	1000	Perdida
35	CREA	Salta	Tolloche	244	53	47
36	CREA	Salta	Urundel	110	21	Perdida
37	INTA	Salta	Metán	6	6	4
39	CREA	Tucumán	Acequiones	214	25	43

La información detallada en este informe está sujeta a modificaciones que podrían surgir al momento de las auditorías de las trampas cromáticas adhesivas realizadas por las instituciones coordinadoras de la Red Nacional de Monitoreo de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) para asegurar la trazabilidad de las mismas.

40	CREA	Tucumán	Alto Verde	42	98	Perdida
41	CREA	Tucumán	Burruyacu	150	Sin datos	500
42	CREA	Tucumán	Chilca	Sin datos	42	Sin datos
43	CREA	Tucumán	Garmendia	630	Sin datos	800
44	CREA	Tucumán	Huasa Pampa	212	407	241
45	CREA	Tucumán	La Bajada	224	12	12
46	CREA	Tucumán	La Cocha 1	1020	47	101
47	CREA	Tucumán	La Cruz	2450	Sin datos	1422
48	CREA	Tucumán	La Invernada	115	1065	295
49	CREA	Tucumán	La Virginia	418	42	Sin datos
50	CREA	Tucumán	Laguna de Robles	2793	1096	Sin datos
51	CREA	Tucumán	Las Cejas	4760	Sin datos	800
52	CREA	Tucumán	Los Pereyra	996	238	301
53	CREA	Tucumán	Los Puestos	169	34	Sin datos
54	CREA	Tucumán	Piedrabuena	107	38	Sin datos
56	CREA	Tucumán	Río Colorado	132	62	96 ✓
57	CREA	Tucumán	Rumi Punco	880	133	112
58	CREA	Tucumán	San Agustín	35	14	42 ✓
59	CREA	Tucumán	Tacanas	Sin datos	17	113
60	CREA	Tucumán	Taco Ralo	2005	15	76
61	CREA	Tucumán	Timbo Viejo	789	210	119 ✓
62	CREA	Tucumán	Trancas	191	19	60
63	CREA	Tucumán	Viclos	Perdida	134	245
64	INTA	Tucumán	Leales	1388	174	Perdida
65	CREA	Santiago del Estero	Bobadal	156	54	Sin datos
66	CREA	Santiago del Estero	El Charco	23	19	119
67	CREA	Santiago del Estero	El Mojón	895	35	81
68	CREA	Santiago del Estero	El Palomar	226	18	215 ✓
69	CREA	Santiago del Estero	Frias 2	17	0	119
70	CREA	Santiago del Estero	Frias	1657	Perdida	43
72	CREA	Santiago del Estero	Isca Yacu 2	98	13	118
73	CREA	Santiago del Estero	Las Delicias	1025	38	67
74	CREA	Santiago del Estero	Lavalle	Perdida	Perdida	1
75	CREA	Santiago del Estero	Nueva Esperanza	Sin datos	15	71
76	CREA	Santiago del Estero	Pampa Pozo	1925	67	120
77	CREA	Santiago del Estero	Pozo de Bedert	Sin datos	40	95
78	CREA	Santiago del Estero	Pozo Hondo	1820	32	7
79	CREA	Santiago del Estero	San Pedro de Guasayán	286	157	155
80	CREA	Santiago del Estero	Termas de Río Hondo	Perdida	27	43
81	CREA	Santiago del Estero	Vinará	219	68	182
82	CREA	Catamarca	El Abra	150	675	238 ✓

La información detallada en este informe está sujeta a modificaciones que podrían surgir al momento de las auditorías de las trampas cromáticas adhesivas realizadas por las instituciones coordinadoras de la Red Nacional de Monitoreo de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) para asegurar la trazabilidad de las mismas.

83	CREA	Catamarca	Los Altos	98	55	243 ✓
----	------	-----------	-----------	----	----	-------

Región Noreste Argentino (NEA)

Región NEA. Captura de adultos de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) con trampas cromáticas adhesivas. Se detalla el número de localidades (#Loc.), Institución responsable del monitoreo, provincia, localidad y el número de adultos *Dalbulus maidis*/trampa de la 21° (03/06 al 19/06), 22° (20/06 al 04/07) y **23° lectura correspondiente al periodo comprendido del 05 de julio al 25 de julio de 2025.** Los valores con el símbolo “✓” fueron sometidos a auditoría.

#Loc.	Institución	Provincia	Localidad	N° adultos <i>D. maidis</i> /trampa		
				21 ° Lectura	22 ° Lectura	23 ° Lectura
2	CREA	Formosa	Perin	Sin datos	35	241 ✓
3	INTA	Formosa	El colorado	3	14	44
4	INTA	Formosa	Comandante Fontana	450	215	Perdida
5	AAPRESID	Chaco	Tres Isletas	26	Sin datos	18
6	AAPRESID	Chaco	Pampa del Infierno	512	266	802
7	AAPRESID	Chaco	Concepcion del Bermejo (Estanislao)	Sin datos	210	108
8	AAPRESID	Chaco	Don Luciano (C. del Bermejo)	Sin datos	Sin datos	Sin datos
9	AAPRESID	Chaco	Villa Angela	17	9	89
10	AAPRESID	Chaco	Las Piedritas	0	Sin datos	0
15	CREA	Chaco	Las Breñas	19	97	68 ✓
18	CREA	Chaco	3 Retoños	41	104	72 ✓
22	CREA	Chaco	Kempe	34	Sin datos	152
24	INTA	Chaco	Gral. Pinedo	186	125	194
25	INTA	Chaco	Tres Isletas	43	21	20
27	INTA	Chaco	Pampa del Infierno	179	52	122
28	INTA	Chaco	Las Breñas	310	611	1358
29	INTA	Chaco	Juan José Castelli	116	124	237
30	INTA	Chaco	Sylvina	147	246	6
31	INTA	Chaco	Basail	92	81	86
32	AAPPCE	Santiago del Estero	Weisburd	1900	321	131
33	AAPPCE	Santiago del Estero	Bandera	94	32	4
34	AAPRESID	Santiago del Estero	Bandera	0	0	0
35	AAPRESID	Santiago del Estero	Arbol Blanco	Sin datos	7	32
36	AAPRESID	Santiago del Estero	Los Juries	27	5	5
37	AAPRESID	Santiago del Estero	Roversi	874	50	67
38	AAPRESID	Santiago del Estero	Otumpas	11	55	Sin datos
39	AAPRESID	Santiago del Estero	Tacañitas	Sin datos	304	86
40	AAPRESID	Santiago del Estero	Sachayoj	8	Sin datos	Perdida
41	AAPRESID	Santiago del Estero	Campo Gallo	273	16	Sin datos

La información detallada en este informe está sujeta a modificaciones que podrían surgir al momento de las auditorías de las trampas cromáticas adhesivas realizadas por las instituciones coordinadoras de la Red Nacional de Monitoreo de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) para asegurar la trazabilidad de las mismas.

42	AAPRESID	Santiago del Estero	Sachayoj	Sin datos	294	Sin datos
44	CREA	Santiago del Estero	SotosCueva	500	0	0
46	CREA	Santiago del Estero	Tierras del Oeste	Sin datos	9	17
47	CREA	Santiago del Estero	Lilo Viejo	850	Sin datos	20 ✓
48	CREA	Santiago del Estero	Cuatro Bocas	0	0	0
49	CREA	Santiago del Estero	Rio Dulce	19	Sin datos	Sin datos
52	CREA	Santiago del Estero	Colonia Alpina	556	Sin datos	25 ✓
53	CREA	Santiago del Estero	Isla Baja	76	14	Sin datos
54	CREA	Santiago del Estero	Tomás Young	170	12	7
61	CREA	Santiago del Estero	El colorado	Sin datos	Sin datos	44 ✓
66	INTA	Santiago del Estero	Quimilí	2050	263	174
67	INTA	Santiago del Estero	Pampa de los Guanacos	1820	223	Perdida
68	AAPPCE	Santa Fe	Villa Minetti	22	14	Sin datos
70	AAPRESID	Santa Fe	Villa Minetti	420	14	40
71	CREA	Santa Fe	La Pelada	446	34	18 ✓
73	CREA	Santa Fe	Ambrosetti	205	3	3
74	CREA	Santa Fe	Arroyo Ceibal	285	37	Perdida
75	CREA	Santa Fe	Hersilia	285	Sin datos	12
76	CREA	Santa Fe	La Penca y Caraguatá	162	26	98 ✓
77	CREA	Santa Fe	Ramayón	1054	35	16
78	CREA	Santa Fe	Alejandra	11	3	1
79	CREA	Santa Fe	Margarita	14	6	36 ✓
80	CREA	Santa Fe	Vera y Pintado	320	24	Sin datos
81	CREA	Santa Fe	Emilia	16	Sin datos	Sin datos
82	CREA	Santa Fe	La María	11	Sin datos	1
83	CREA	Santa Fe	La Osca	175	16	Sin datos
85	CREA	Santa Fe	Malabrigo	153	218	88 ✓
86	CREA	Santa Fe	Soledad	5	1	0
88	INTA	Santa Fe	Reconquista	217	138	545
89	INTA	Santa Fe	Calchaquí	7	1	3
90	INTA	Santa Fe	Logroño	72	5	3
91	INTA	Santa Fe	San javier	257	35	23
92	INTA	Santa Fe	La sarita	219	1089	763

La información detallada en este informe está sujeta a modificaciones que podrían surgir al momento de las auditorías de las trampas cromáticas adhesivas realizadas por las instituciones coordinadoras de la Red Nacional de Monitoreo de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) para asegurar la trazabilidad de las mismas.

Región Litoral

Región Litoral. Captura de adultos de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) con trampas cromáticas adhesivas. Se detalla el número de localidades (#Loc.), Institución responsable del monitoreo, provincia, localidad y el número de adultos *Dalbulus maidis*/trampa de la 21° (03/06 al 19/06), 22° (20/06 al 04/07) y 23° lectura correspondiente al periodo comprendido del 05 de julio al 25 de julio de 2025. Los valores con el símbolo “✓” fueron sometidos a auditoría.

#Loc.	Institución	Provincia	Localidad	N° adultos <i>D. maidis</i> /trampa		
				21° Lectura	22° Lectura	23° Lectura
1	AAPRESID	Corrientes	Mercedes	15	6	5
2	AAPRESID	Corrientes	Ambrosio	Perdida	Sin datos	2
3	AAPRESID	Corrientes	Corrientes	55	10	89
4	AAPRESID	Corrientes	Bella Vista	10	2	3
5	INTA	Corrientes	Sauce	9	2	0
6	INTA	Corrientes	Estancia el Rocio Copra	0	0	2
7	INTA	Corrientes	Mercedes	9	11	6
8	INTA	Corrientes	Virasoro	17	8	7
9	INTA	Corrientes	Goya	21	7	13
10	INTA	Corrientes	Ituzaingo	18	Perdida	0
11	INTA	Corrientes	Esquina	0	0	0
12	AAPPCE	Entre Ríos	Don Cristobal	33	9	4
13	AAPPCE	Entre Ríos	Isletas	3	0	1
14	AAPPCE	Entre Ríos	La paz	0	0	2
15	AAPPCE	Entre Ríos	Hinojal	121	11	38
16	AAPRESID	Entre Ríos	Colonia Celina	0	0	14
17	AAPRESID	Entre Ríos	Viale	1	Perdida	0
19	AAPRESID	Entre Ríos	Gualedguay	0	2	0
20	AAPRESID	Entre Ríos	Paso de las Piedras	0	5	9
21	AAPRESID	Entre Ríos	Villa Hernandarias	2	0	0
22	AAPRESID	Entre Ríos	Don Cristobal	17	11	8
23	AAPRESID	Entre Ríos	Crespo	0	0	0
24	CREA	Entre Ríos	Las Garzas	0	1	4 ✓
25	CREA	Entre Ríos	Santa Elena	Sin datos	2	0
27	CREA	Entre Ríos	La Paz	21	19	16 ✓
28	CREA	Entre Ríos	Molino Doll	3	0	Sin datos
29	CREA	Entre Ríos	Feliciano	Sin datos	0	0 ✓
30	CREA	Entre Ríos	Villa Lila	2	0	1 ✓
31	CREA	Entre Ríos	Gualedguay	0	0	0
32	CREA	Entre Ríos	Victoria	0	1	1 ✓
33	CREA	Entre Ríos	Arroyo Barú	Sin datos	Sin datos	0

La información detallada en este informe está sujeta a modificaciones que podrían surgir al momento de las auditorías de las trampas cromáticas adhesivas realizadas por las instituciones coordinadoras de la Red Nacional de Monitoreo de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) para asegurar la trazabilidad de las mismas.

35	INTA	Entre Ríos	La Paz	10	1	1
36	INTA	Entre Ríos	Nogoya	162	70	12
37	INTA	Entre Ríos	Urdinarrain	18	12	Perdida
38	INTA	Entre Ríos	Concepción del Uruguay	59	27	Perdida
39	INTA	Entre Ríos	Diamante	6	0	1
40	INTA	Entre Ríos	Guaaleguay	44	19	4
41	INTA	Entre Ríos	Parana	123	104	6 ✓

Región Centro Norte

Región Centro Norte. Captura de adultos de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) con trampas cromáticas adhesivas. Se detalla el número de localidades (#Loc.), Institución responsable del monitoreo, provincia, localidad y el número de adultos *Dalbulus maidis*/trampa de la 21° (03/06 al 19/06), 22° (20/06 al 04/07) y 23° lectura correspondiente al periodo comprendido del 05 de julio al 25 de julio de 2025. Los valores con el símbolo “✓” fueron sometidos a auditoria.

#Loc.	Institución	Provincia	Localidad	N° adultos <i>D. maidis</i> /trampa		
				21° Lectura	22° Lectura	23° Lectura
1	AAPRESID	San Luis	La Toma	4	0	0
2	AAPPCE	Córdoba	Corralito	326	30	24
3	AAPPCE	Córdoba	Freyre	79	29	5
4	AAPPCE	Córdoba	Morteros	4	4	4
5	AAPPCE	Córdoba	Rayo Cortado	57	53	Perdida
6	AAPPCE	Córdoba	Jesus María	460	5	5
7	AAPPCE	Córdoba	El Fortín	13	2	Perdida
8	AAPPCE	Córdoba	Río Ceballos	130	Perdida	Perdida
9	AAPRESID	Córdoba	Villa María	47	2	0
10	AAPRESID	Córdoba	Cañada de Luque	Perdida	5	11
11	AAPRESID	Córdoba	Capilla de Sitón	191	34	10
12	AAPRESID	Córdoba	Carrilobo	105	5	1
13	AAPRESID	Córdoba	Devoto	365	4	0
14	AAPRESID	Córdoba	Eufrasio Loza	185	37	43
15	AAPRESID	Córdoba	Laguna Larga	19	3	1
16	AAPRESID	Córdoba	Las Bajadas	45	4	12
17	AAPRESID	Córdoba	Monte del Rosario	1727	112	14
18	AAPRESID	Córdoba	Montecristo	74	6	0
19	AAPRESID	Córdoba	Obispo trejo	5	1	1
20	AAPRESID	Córdoba	Río Segundo- T1	167	17	Perdida
21	AAPRESID	Córdoba	San Francisco	2	2	0
22	AAPRESID	Córdoba	Santa Catalina	540	Sin datos	13

La información detallada en este informe está sujeta a modificaciones que podrían surgir al momento de las auditorías de las trampas cromáticas adhesivas realizadas por las instituciones coordinadoras de la Red Nacional de Monitoreo de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) para asegurar la trazabilidad de las mismas.

23	AAPRESID	Córdoba	Tancacha	24	7	9
24	AAPRESID	Córdoba	Villa de Maria	20	9	Sin datos
25	AAPRESID	Córdoba	Arroyito	166	16	0
26	AAPRESID	Córdoba	Villa Sta. Rosa	10	40	12
27	AAPRESID	Córdoba	Hernando	0	0	0
28	CREA	Córdoba	Piquillín	738	17	5
29	CREA	Córdoba	Las Chilcas	61	38	37 ✓
30	CREA	Córdoba	Sebastián el Cano	72	6	15
31	CREA	Córdoba	El Tío	43	3	Sin datos
32	CREA	Córdoba	Colonia Tiroleza	337	3	1 ✓
33	CREA	Córdoba	Las Astillas	140	23	12 ✓
34	CREA	Córdoba	Mi Granja	152	0	Sin datos
35	CREA	Córdoba	Sacanta	11	20	Sin datos
36	CREA	Córdoba	Sinsacate	22	1	3
37	CREA	Córdoba	Tala Norte	34	1	2 ✓
38	INTA	Córdoba	Manfredi	49	14	1
39	AAPPCE	Santa Fe	Ceres	117	2	11
40	AAPPCE	Santa Fe	Gálvez	52	23	3
41	AAPPCE	Santa Fe	Humboldt	3	0	0
42	AAPPCE	Santa Fe	Landeta	92	1	Perdida
43	AAPPCE	Santa Fe	Piamonte	22	1	Perdida
44	AAPPCE	Santa Fe	Susana	45	11	Sin datos
45	AAPPCE	Santa Fe	San Guillermo	322	39	5 ✓
46	AAPPCE	Santa Fe	San Jorge	1	0	0
47	AAPPCE	Santa Fe	San Vicente	74	21	15 ✓
48	AAPPCE	Santa Fe	Santa Clara de Saguier	4	4	0
49	AAPPCE	Santa Fe	Vila	32	8	2
50	AAPPCE	Santa Fe	López	18	3	0
51	AAPPCE	Santa Fe	Campo Piaggio	26	5	0
52	AAPPCE	Santa Fe	San Carlos Norte	5	0	0
53	AAPRESID	Santa Fe	El Trébol	Perdida	Sin datos	0
54	AAPRESID	Santa Fe	Emilia	0	438	110
55	AAPRESID	Santa Fe	Gálvez	20	1	Sin datos
56	AAPRESID	Santa Fe	La Camila	1583	55	11
57	AAPRESID	Santa Fe	Maria Juana	102	0	0
58	AAPRESID	Santa Fe	Progreso	221	171	16
59	AAPRESID	Santa Fe	Sastre	2	1	0
61	AAPRESID	Santa Fe	Helvecia	2	3	1
62	AAPRESID	Santa Fe	Aldao	4	Sin datos	Sin datos
63	CREA	Santa Fe	San Jerónimo Norte	70	18	4 ✓
64	CREA	Santa Fe	Ataliva	115	Sin datos	Sin datos
65	CREA	Santa Fe	Bernardo de Irigoyen	66	8	5

La información detallada en este informe está sujeta a modificaciones que podrían surgir al momento de las auditorías de las trampas cromáticas adhesivas realizadas por las instituciones coordinadoras de la Red Nacional de Monitoreo de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) para asegurar la trazabilidad de las mismas.

66	CREA	Santa Fe	Crispi	Sin datos	3	9 ✓
67	CREA	Santa Fe	Esperanza	279	Sin datos	Sin datos
68	CREA	Santa Fe	Moisés Ville	49	Sin datos	Sin datos
69	CREA	Santa Fe	Rincón de Ávila	207	Sin datos	Sin datos
70	CREA	Santa Fe	San Fabián	5	1	0 ✓
71	CREA	Santa Fe	San Martín de las Escobas	75	10	0
72	CREA	Santa Fe	Cañada Rosquín	7	2	0
73	CREA	Santa Fe	El Trébol 4	0	0	0 ✓
74	INTA	Córdoba	Marull	Sin datos	0	0
75	INTA	Santa Fe	Centeno	186	20	5
76	INTA	Santa Fe	Rafaela	1175	39	25
77	INTA	Santa Fe	Ceres	229	23	11
78	INTA	Santa Fe	San Justo	326	23	4

Región Centro Sur

Región Centro Sur. Captura de adultos de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) con trampas cromáticas adhesivas. Se detalla el número de localidades (#Loc.), Institución responsable del monitoreo, provincia, localidad y el número de adultos *Dalbulus maidis*/trampa de la 21° (03/06 al 19/06), 22° (20/06 al 04/07) y 23° lectura correspondiente al periodo comprendido del 05 de julio al 25 de julio de 2025. Los valores con el símbolo “✓” fueron sometidos a auditoría.

#Loc.	Institución	Provincia	Localidad	N° adultos <i>D. maidis</i> /trampa		
				21° Lectura	22° Lectura	23° Lectura
1	AAPRESID	San Luís	La Angelina	0	0	0
2	AAPRESID	San Luís	Nueva Galia	0	0	0
3	CREA	San Luís	Buena Esperanza	20	3	0 ✓
4	CREA	San Luís	Juan Jorba	7	9	Sin datos
5	CREA	San Luís	Los molles	823	31	Sin datos
6	CREA	San Luís	Naschel	72	2	2 ✓
7	CREA	San Luís	San Martín	25	0	0
8	INTA	San Luís	San Luis 1	0	0	0
9	INTA	San Luís	Quines	3	0	1
10	AAPPCE	Córdoba	Ana Zumaran	14	0	0
11	AAPPCE	Córdoba	Cnel. Baigorria	6	7	2
12	AAPPCE	Córdoba	General Roca	32	7	2
13	AAPPCE	Córdoba	Gral. Cabrera	12	11	3
14	AAPPCE	Córdoba	La playosa	19	4	0
15	AAPPCE	Córdoba	Ordoñez	0	0	0
16	AAPPCE	Córdoba	Tosquita	7	5	2

La información detallada en este informe está sujeta a modificaciones que podrían surgir al momento de las auditorías de las trampas cromáticas adhesivas realizadas por las instituciones coordinadoras de la Red Nacional de Monitoreo de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) para asegurar la trazabilidad de las mismas.

17	AAPPCE	Córdoba	Arroyo Cabral	20	3	0
18	AAPPCE	Córdoba	Villa María	23	1	1
19	AAPRESID	Córdoba	Benjamín Gould	34	6	1
20	AAPRESID	Córdoba	Buchardo	0	0	0
21	AAPRESID	Córdoba	Coronel Moldes	14	7	4
22	AAPRESID	Córdoba	Corral de Bustos	8	4	0
23	AAPRESID	Córdoba	Guatimozin	0	0	0
24	AAPRESID	Córdoba	Idiazabal	Perdida	0	2
25	AAPRESID	Córdoba	Lecueder	0	0	0
26	AAPRESID	Córdoba	Villa Valeria	0	0	Sin datos
27	AAPRESID	Córdoba	Jovita	0	0	0
28	AAPRESID	Córdoba	Adelia María	19	2	0
29	CREA	Córdoba	Chilibroste	98	Sin datos	Sin datos
30	CREA	Córdoba	Justiniano Posse	Sin datos	Sin datos	Sin datos
31	CREA	Córdoba	Huinca Renanco	Sin datos	2	0 ✓
32	CREA	Córdoba	Arias	4	Sin datos	Sin datos
34	CREA	Córdoba	Cuatro Vientos	14	4	1
35	CREA	Córdoba	General Levalle	31	4	0
36	CREA	Córdoba	La Carlota	0	0	0 ✓
37	CREA	Córdoba	Melo	4	0	0
38	CREA	Córdoba	Monte de los Gauchos	46	17	0
39	CREA	Córdoba	Punta del Agua	37	4	1
40	CREA	Córdoba	Reduccion	74	Sin datos	0
41	CREA	Córdoba	Rio Seco	220	3	3 ✓
42	CREA	Córdoba	Vicuña Mackenna	5	7	0
43	CREA	Córdoba	Villa valeria	Sin datos	1	0
44	CREA	Córdoba	Ballesteros	8	2	0
45	CREA	Córdoba	Monte Buey	24	4	0 ✓
46	INTA	Córdoba	Marcos Juarez 2	34	9	2
47	AAPPCE	Santa Fe	Álvarez	7	2	1
48	AAPPCE	Santa Fe	Bustinza	26	4	0
49	AAPPCE	Santa Fe	Godoy	8	2	2
50	AAPPCE	Santa Fe	Hughes	1	0	0
51	AAPPCE	Santa Fe	Iriarte	0	Perdida	0
52	AAPPCE	Santa Fe	Máximo Paz	5	2	Perdida
53	AAPPCE	Santa Fe	San Jerónimo Sur	2	0	0
54	AAPPCE	Santa Fe	Teodelina	4	3	0
55	AAPPCE	Santa Fe	Timbúes	27	5	5
56	AAPPCE	Santa Fe	Venado tuerto	28	0	Perdida
57	AAPPCE	Santa Fe	Villa Mugueta	9	5	0
58	AAPPCE	Santa Fe	Villada	19	3	2
59	AAPPCE	Santa Fe	Wheelright	22	0	0

La información detallada en este informe está sujeta a modificaciones que podrían surgir al momento de las auditorías de las trampas cromáticas adhesivas realizadas por las instituciones coordinadoras de la Red Nacional de Monitoreo de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) para asegurar la trazabilidad de las mismas.

60	AAPPCE	Santa Fe	J. B. Molina	21	7	1
61	AAPPCE	Santa Fe	Armstrong	18	0	0
63	AAPRESID	Santa Fe	Chañar Ladeado	0	0	Perdida
64	AAPRESID	Santa Fe	Monte de Oca	Perdida	0	Perdida
65	AAPRESID	Santa Fe	Zavalla	61	6	0
66	AAPRESID	Santa Fe	Villa Cañas	0	0	0
67	AAPRESID	Santa Fe	Pueblo Uranga	31	8	Sin datos
68	CREA	Santa Fe	Clucellas	52	3	Sin datos
69	CREA	Santa Fe	Maria teresa	0	0	Sin datos
71	CREA	Santa Fe	Las Rosas	0	0	Sin datos
72	CREA	Santa Fe	Teodelina	0	0	Sin datos
73	INTA	Santa Fe	Pujato	19	8	Perdida
74	INTA	Santa Fe	Cañada de Gómez	34	0	0
75	AAPPCE	Buenos Aires	Arrecifes	20	3	0
76	AAPPCE	Buenos Aires	La invensible	1	0	0
77	AAPPCE	Buenos Aires	La Violeta	16	2	0
78	AAPPCE	Buenos Aires	17 de Agosto	0	0	0
79	AAPPCE	Buenos Aires	América	0	0	0
80	AAPPCE	Buenos Aires	Chacabuco	0	Perdida	0
81	AAPPCE	Buenos Aires	Cnel. Dorrego	0	0	0
82	AAPPCE	Buenos Aires	Colón	0	0	0
83	AAPPCE	Buenos Aires	Coronel Suarez	0	0	0
84	AAPPCE	Buenos Aires	Cura Malal	0	0	0
85	AAPPCE	Buenos Aires	Ferré	5	0	0
86	AAPPCE	Buenos Aires	Germania	0	0	0
87	AAPPCE	Buenos Aires	Gral. Arenales T1	Sin datos	0	0
88	AAPPCE	Buenos Aires	Gobernador Castro	4	0	0
89	AAPPCE	Buenos Aires	González Moreno	1	Perdida	0
90	AAPPCE	Buenos Aires	Guaminí	0	0	0
91	AAPPCE	Buenos Aires	Leandro N. Alem	0	0	0
92	AAPPCE	Buenos Aires	Los Toldos	0	0	0
93	AAPPCE	Buenos Aires	Morse	Sin datos	0	0
94	AAPPCE	Buenos Aires	Pasman	0	0	0
95	AAPPCE	Buenos Aires	Pehuajó	0	0	0
96	AAPPCE	Buenos Aires	Pergamino	0	0	0
97	AAPPCE	Buenos Aires	Ramallo	1	0	0
98	AAPPCE	Buenos Aires	Roberts	3	0	0
99	AAPPCE	Buenos Aires	Tres Arroyos	0	0	0
100	AAPPCE	Buenos Aires	Villa Gral. Savio	1	0	0
101	AAPPCE	Buenos Aires	Inés Indart	0	0	0
102	AAPPCE	Buenos Aires	Pirovano	0	0	0
103	AAPPCE	Buenos Aires	Zavallá	0	0	0

La información detallada en este informe está sujeta a modificaciones que podrían surgir al momento de las auditorías de las trampas cromáticas adhesivas realizadas por las instituciones coordinadoras de la Red Nacional de Monitoreo de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) para asegurar la trazabilidad de las mismas.

104	AAPPCCE	Buenos Aires	Pigüé	0	0	0
105	AAPRESID	Buenos Aires	25 de Mayo Salesiana	0	0	0
106	AAPRESID	Buenos Aires	Berraondo	0	0	0
107	AAPRESID	Buenos Aires	Carhue	0	0	0
108	AAPRESID	Buenos Aires	Casbas	0	0	0
109	AAPRESID	Buenos Aires	Chascomús	Sin datos	0	0
110	AAPRESID	Buenos Aires	La Niña	Sin datos	0	Sin datos
112	AAPRESID	Buenos Aires	Necochea	0	0	0
113	AAPRESID	Buenos Aires	Paraje Fra Pal	0	0	0
114	AAPRESID	Buenos Aires	Salto	0	0	0
115	AAPRESID	Buenos Aires	Trenque Lauquen	0	0	0
116	AAPRESID	Buenos Aires	Chillar	0	0	0
117	AAPRESID	Buenos Aires	Sur Bordenave	0	0	0
118	AAPRESID	Buenos Aires	Puan	0	0	0
119	AAPRESID	Buenos Aires	Viboras	0	0	0
120	AAPRESID	Buenos Aires	12 de Octubre	4	0	0
122	AAPRESID	Buenos Aires	Ferré	3	3	0
123	AAPRESID	Buenos Aires	Vedia	4	6	0
124	AAPRESID	Buenos Aires	San Miguel de Arcángel	0	0	0
125	CREA	Buenos Aires	América	14	1	0
126	CREA	Buenos Aires	Arenaza	0	0	Perdida
127	CREA	Buenos Aires	Carlos Tejedor	6	1	0 ✓
128	CREA	Buenos Aires	Casey	0	0	0
129	CREA	Buenos Aires	Daireaux	0	0	0 ✓
130	CREA	Buenos Aires	General Arenales	0	Sin datos	Sin datos
131	CREA	Buenos Aires	General Villegas	2	0	0
132	CREA	Buenos Aires	Guanaco	2	0	0
133	CREA	Buenos Aires	Henderson	2	0	0 ✓
134	CREA	Buenos Aires	Mari Lauque	1	0	0
135	CREA	Buenos Aires	Moctezuma	1	0	0
136	CREA	Buenos Aires	Treinta de Agosto	3	0	0
137	CREA	Buenos Aires	Ayacucho	0	0	0
138	CREA	Buenos Aires	Gral. Madariaga	0	0	0
139	CREA	Buenos Aires	Orense	0	0	0
140	CREA	Buenos Aires	Bragado	0	0	0
141	CREA	Buenos Aires	San Andrés de Giles	0	0	Sin datos
142	CREA	Buenos Aires	San Pedro	25	2	0
143	CREA	Buenos Aires	Alberdi	2	1	0
144	CREA	Buenos Aires	Junín	1	0	0
145	CREA	Buenos Aires	Necochea	Sin datos	0	Sin datos
146	CREA	Buenos Aires	Pergamino	Sin datos	0	0

La información detallada en este informe está sujeta a modificaciones que podrían surgir al momento de las auditorías de las trampas cromáticas adhesivas realizadas por las instituciones coordinadoras de la Red Nacional de Monitoreo de la chicharrita del maíz (*Dalbuls maidis*) para asegurar la trazabilidad de las mismas.

148	CREA	Buenos Aires	Las Armas	0	0	0
149	CREA	Buenos Aires	Catriló	0	0	0
150	INTA	Buenos Aires	Chivilcoy	11	2	0
151	INTA	Buenos Aires	Pergamino	40	8	0
152	INTA	Buenos Aires	Conesa	15	0	Perdida
153	INTA	Buenos Aires	San antonio de Areco	36	3	0
154	INTA	Buenos Aires	Bordenave	0	0	0
155	INTA	Buenos Aires	Gral. Villegas	4	1	0
156	INTA	Buenos Aires	Ascasubi	0	0	0
157	INTA	Buenos Aires	Bolivar	0	0	0
158	INTA	Buenos Aires	Pehuajó	0	0	0
159	INTA	Buenos Aires	Balcarce	0	0	0
160	AAPPCE	La Pampa	Macachín	0	0	0
161	AAPRESID	La Pampa	Quemu Quemu	0	Sin datos	Sin datos
162	CREA	La Pampa	General Pico	6	0	0
163	CREA	La Pampa	Quemú Quemú	3	1	0
164	CREA	La Pampa	Santa Rosa	0	0	0 ✓
165	INTA	La Pampa	Anguil 1	0	0	0

La información detallada en este informe está sujeta a modificaciones que puedan surgir al momento de las auditorías de las trampas cromáticas adhesivas realizadas por las instituciones coordinadoras de la Red Nacional de Monitoreo de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) para asegurar la trazabilidad de las mismas.

ANEXO 1

En respuesta al problema del complejo del achaparramiento del maíz transmitido por la chicharrita (*Dalbulus maidis*), que afectó gran parte de la superficie maicera de la Argentina, se desarrolló una Red Nacional de Monitoreo con trampas cromáticas adhesivas. Esta iniciativa es impulsada por instituciones claves del sector agropecuario argentino, mencionándose a la Asociación Argentina de Protección Profesional de Cultivos Extensivos (**AAPPCE**), Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa (**AAPRESID**), Cámara de sanidad Agropecuaria y Fertilizantes (**CASAFE**), Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (**CONICET**), Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola (**CREA**), Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres (**EEAOC**), Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (**INTA**), Asociación Maíz y Sorgo Argentino (**MAIZAR**), y el Servicio Nacional de sanidad y Calidad Agroalimentaria (**SENASA**).

Los objetivos perseguidos con la Red Nacional de monitoreo son: a) Informar sobre la captura con trampas cromáticas adhesivas de los adultos de *D. maidis* en diferentes regiones productoras del cultivo de maíz en Argentina (Figura 10) y b) Informar sobre el porcentaje de la infección estacional de los adultos de *D. maidis* a Corn Stunt Spiroplasma (CSS), que estará a cargo del **Centro de Bioinvestigaciones de la UNNOBA - CICBA (CONICET)**.

Las Instituciones integrantes de la Red Nacional de Trampas de Monitoreo de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) no se responsabilizan por los análisis, conclusiones y/o mensajes distintos a los enunciados en el correspondiente informe.




Figura 9. Zonas maiceras de la Argentina y Uruguay donde se realiza el monitoreo de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*).

La información detallada en este informe está sujeta a modificaciones que podrían surgir al momento de las auditorías de las trampas cromáticas adhesivas realizadas por las instituciones coordinadoras de la Red Nacional de Monitoreo de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) para asegurar la trazabilidad de las mismas.

Para hacer más visible la información, se estableció una escala de tonalidad en la gama de azules el cual va desde el más tenue al más intenso en función de las cantidades de adultos de *D. maidis* capturados por la trampa, detallándose cada categoría en la Tabla 1. **Se aclara que los valores detallados en las mismas no hacen referencia al grado de peligrosidad de esta plaga en las localidades relevadas.** Las trampas cromáticas adhesivas representan una de las metodologías para el monitoreo de los adultos de *D. maidis*, debiéndose complementar con otras técnicas para tener una visión holística de esta problemática.

Tabla 1. Detalle de la escala de tonalidad de color azul asignado a las categorías correspondientes a la cantidad de adultos de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) capturados con trampas cromáticas adhesivas.

0 adultos de <i>D. maidis</i>/trampa
1 a 4 adultos de <i>D. maidis</i>/trampa
5 a 20 adultos de <i>D. maidis</i>/trampa
21 a 50 adultos de <i>D. maidis</i>/trampa
51 a 100 adultos de <i>D. maidis</i>/trampa
> 100 adultos de <i>D. maidis</i>/trampa

La información detallada en este informe está sujeta a modificaciones que podrían surgir al momento de las auditorías de las trampas cromáticas adhesivas realizadas por las instituciones coordinadoras de la Red Nacional de Monitoreo de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) para asegurar la trazabilidad de las mismas.