

Brechas de producción en recrías

Región Sudeste · Relevamiento a asesores CREA

Jornada Recría en Foco · Las Flores, 23 de octubre de 2026

Ing. Matias Bodini · Asesor CREA Lezama

Cómo se armó este trabajo

1

Consulta a asesores

Pedimos a los asesores del Sudeste que describieran recrías representativas de sus grupos CREA.

2

Primer análisis

Con esas respuestas armamos un diagnóstico de brechas y preguntas para enriquecerlo.

3

Base común

Una base de datos en línea para completar, validar y comparar casos de toda la región.

4

Recría en Foco

Compartimos el análisis y lo enriquecemos con la mirada de los empresarios.

Estamos acá

23/10 · Las Flores

El recorrido: cuatro preguntas

1

6 min

¿Quién recría y cómo?

Por qué crece la recría, tipos, origen del ternero y cuatro recría que representan a la región

2

10 min

¿Dónde está la brecha?

Kg de carne por ha, comparación entre empresas y las dos palancas: carga y ganancia individual

3

10 min

¿Cómo se cierra?

El invierno, fertilizar, la gente y cuánto puede mejorar cada modelo

4

5 min

¿Le gana al negocio?

Margen al intensificar, relación de precios y contra qué cultivo compite cada lote

Cierre: claves de una recría profesional, preguntas para ustedes y próximos pasos · 6 min

La información de base

Relevamiento propio

Encuesta a asesores de 17 grupos · base común en línea con 99 modelos · resultados reales de empresas de la región

Modelos económicos

CREA Maipú · márgenes de recría en USD (oct-2026) · «¿Qué modelo rinde más?», CREA Sudeste (2025) · CREA Área Ganadería (2024/25)

Experiencia medida en el Salado

INTA CEI Chascomús (2020; ciclo Las Armas may-2026; charla CREA Lezama jul-2026) · silo en recría a campo (UCA, 2026) · restricción invernal (INTA Bordenave)

Referencias técnicas

D. Colombatto (FAUBA, CREA Lezama 2025) · S. Riffel (Chacra; Campus Bovino 2025) · Manual de buenas prácticas de recría · casos del Salado y Azul

Mercado e insumos

Exportaciones de carne 2026 (Gobierno nacional; El Litoral) · urea, maíz y dólar (oct-2026) · respuesta a la fertilización (2022)



Temas que mencionaron los asesores (más grande = más grupos).

Qué relevamos

17/17

grupos CREA respondieron
(de 165 empresas)

99

modelos de recría
en la base común

4

recrías tipo que
representan a la región

Qué preguntamos a cada asesor

Pesos y duración

Carga

Recursos y parcelas

Suplementación

Fertilización

Pesadas y sanidad

Capacitación e incentivos

Ambiente y agricultura

¿Por qué crece la recría en el Sudeste?

ANTES Cría y agricultura



HOY Recrás más largas, más pesadas

1 Más eficiente

Por kilo de carne, la recría usa mucho menos pasto que la cría.

~3 veces

menos pasto por kg de carne (INTA)

2 Flexibilidad

Vende cuando conviene, ajusta la carga ante sequía y estabiliza la cría.

88 → 91%

de preñez al sumar recría (INTA)

3 Diluir la compra-venta

El ternero se compra más caro de lo que se vende: más kilos diluyen esa diferencia.

4,50 / 3,50

USD/kg de compra y de venta (caso Lezama)

4 Agricultura más ajustada

Números más finos: la recría compite por el lote.

65%

de los modelos recrían en lotes agrícolas

5 La exportación pide peso

Crecen las ventas a EE.UU. y Europa, y se faena más pesado.

+46%

exportación ene-may 2026

La recría convierte al ternero en una decisión: cuándo, con cuánto peso y a quién vender.

¿Quién hace recría en la región?

1

Sin recría

Venden el ternero en la zafra, o no hacen cría

16% 8 de 51 empresas

2

Recría de oportunidad

Retienen 1 a 4 meses para dispersar ventas o esperar precio. Decisión comercial

0% 0 de 51 empresas

3

Recría planificada

Objetivo de peso y destino. Acá se mide la brecha y aplican las claves

84% 43 de 51 empresas

Preliminar: 51 de 165 empresas, de 5 de los 17 grupos.

Pregunta clave: ¿por qué una empresa no recría, o recría solo por oportunidad? Forraje, capital, números o costumbre. Ahí puede estar la brecha más grande de la región.

¿De dónde viene el ternero? Tres modelos

1 Cría propia

El productor pone el ternero, el pasto y el manejo

- Controla genética, sanidad y peso al destete
- Parición concentrada: destete de 171 a 192 kg

A tener en cuenta: Costo de oportunidad: vender el ternero en la zafra

2 Compra de invernada

Compra terneros todos los años

- Ajusta la escala al pasto disponible
- Elige categoría y peso de entrada

A tener en cuenta: Riesgo de precio de compra, sanidad desconocida y lotes desparejos

3 Capitalización

Un tercero pone la hacienda; el campo, el pasto y el manejo

- No inmoviliza capital en hacienda
- Reparten los kg ganados en % pactado

A tener en cuenta: Definir el %, pesadas confiables, sanidad a cargo de quién y plazos

Cuatro recrías que representan a la región

1

Extensivo

Tuyú • prom. 4 socios

Entrada → salida

190 → 300 kg

Carga • ADPV

1,8 cab/ha • s/d

Campo natural y
promociones, sin
suplemento

2

Pastoril raigrás

Rauch-Udaquiola

Entrada → salida

180 → 260 kg

Carga • ADPV

3 cab/ha • 0,41 kg/d

Promociones de raigrás, sin
suplemento

3

Silaje + carga

Río Salado • silo (mediana)

Entrada → salida

180 → 320 kg

Carga • ADPV

3,6 cab/ha • 0,64 kg/d

Pasturas y verdeos + silo de
maíz en invierno

4

Grano + corral inicio

Arroyo de Las Flores

Entrada → salida

215 → 340 kg


Carga • ADPV

~4 cab/ha • 0,81 kg/d

Verdeos + grano de maíz al
1,6% PV

Hasta 2,5 veces más carne por hectárea

Kg de carne por ha durante la recría



×2,5

kg/ha del silaje o del grano frente al piso extensivo


×2,6

kg/ha/día: 1,2 en raigrás vs. 3,2 con grano


=

silaje y grano llegan a lo mismo: uno por carga, el otro por ganancia


¿Dónde está tu recría frente a las demás?



Cada zona tiene su techo, y también su brecha



Kg de carne/ha por zona · rango y mediana




En cada zona hay casos que producen el doble o el triple.
Parte es ambiente; con el mismo ambiente, el resto es manejo.

¿Qué tienen en común los que producen más?

Kg de carne/ha (mediana)

Lo hacen

No lo hacen



¿Cuántos lo hacen?

% de los modelos de la base

96%

Pesa

82%

Capacita

59%

Corral de inicio

35%


Incentivos

24%

Parcelas ≤3 días

Las parcelas cortas suman +44% y las hace solo 1 de cada 4: ahí está la oportunidad.

Las dos palancas: carga × ganancia individual



Cada curva es igual producción por ha y día.

Se sube de curva cargando más (hacia la derecha) o ganando más por animal (hacia arriba). La mayoría está entre 0,45 y 0,65 kg/día: la diferencia la hace la carga.


¿Por dónde se te va la brecha?

$\text{Kg/ha} = \text{carga} \times \text{ganancia diaria} \times \text{días}$. Cada caso, contra los mejores de su zona:

Castelli • capitalizado

Salado • a pasto

300 → 500 kg/ha




	Hoy	Mejores
Carga	2,5	3,8
Ganancia	0,51	0,60
Días	235	219

Le falta carga

Rauch • sin bolsa

Centro-sur • raigrás

240 → 450 kg/ha



	Hoy	Mejores
Carga	3,0	3,0
Ganancia	0,41	0,71
Días	195	210

Le falta ganancia

Tapalqué • naturales

Centro-sur • campo natural

150 → 450 kg/ha



	Hoy	Mejores
Carga	1,5	3,0
Ganancia	0,42	0,71
Días	240	210

Le faltan las dos

El kg/ha dice cuánto te falta; **la descomposición dice qué tocar primero.**

Lo que mide la experiencia en la Cuenca del Salado

1

Otoño: el verdeo necesita energía

50 → 570 g/día

en verdeo de otoño: sin suplemento (2004) y con 2-3 kg de grano o 9 kg de silo (promedio 2005-2011)

El verdeo de otoño tiene mucha proteína y poca energía. El suplemento se pagó por la carga que permitió sostener.

2

Pastoreo por horas

-25% de superficie

con igual ganancia: 5 horas de acceso contra parcela de 24 horas

Se cosecha el 65-80% del verdeo. En avena, cada ternero come 1,9 kg de materia seca por hora.

3


Corral de inicio para la cola

4,5 a 1 de conversión

kg de alimento por kg ganado; menos de \$2.000 por kg ganado

Terneros de 130-145 kg salen con 170 kg. Apuntar a 850-900 g/día: más alto se pierde después a pasto.

El invierno define la recría



-41 kg

por ternero en 3 meses de invierno;
~120 kg/ha con 3 cab/ha

¿Se recupera después?


Restricción de 0 a 3 meses	nada
De 3 a 6 meses	18%
De 6 a 8 meses	21%
De 9 a 18 meses	39%

Ganar poco es caro y enferma: con pocas defensas, el animal se enferma más.

¿Con qué cubre cada modelo el invierno?

Crecimiento del pasto

kg MS/ha/día (CEI Chascomús)



Pastoril de raigrás

Rauch • 3 cab/ha • 0,41 kg/d

Promoción de raigrás

sin suplemento: el invierno se pasa con poco pasto

Pastura + silo en otoño

Lezama propio 3 • 3,6 cab/ha • 0,67 kg/d

Pastura

Promoción de raigrás

Pastura

Silo de maíz

Verdeo + grano

Las Flores • 4 cab/ha • 0,81 kg/d

Corral

Avena y raigrás

Grano de maíz 1,6% PV

Recría larga con alfalfa

Vallimanca • 5 cab/ha • 0,55 kg/d

Alfalfa

Verdeo de invierno

Pastura con alfalfa

Silo de maíz


Todos cruzan el mismo bache: con energía en invierno se cargan 4 a 5 cab/ha; a pasto solo, 3.

Autoconsumo con limitador en invierno

Por qué sirve

- 1 Falta energía, no proteína**
En raigrás y verdeos: de 0,19 a 0,64 kg/día con silo
- 2 Ahorra mano de obra**
Suplementar día por medio dio la misma ganancia
- 3 Sostiene más carga**
No solo más ganancia por animal
- 4 Ya se usa en la región**
Vallimanca, Pila 1 y Roque Pérez

Consumo de suplemento en autoconsumo (% del peso vivo)



Condiciones

- Limitador confiable: la sal sube el consumo de agua y depende de su calidad
- Lote parejo y ~10 cm de comedero por ternero, cerca del agua
- Adaptación gradual; al salir, 15 días más a campo
- Energía en verdeos; en pastizal o diferidos, proteína
- Medir: pesadas y kg de suplemento por cabeza

Sube la ganancia y la carga de invierno sin sumar gente, si se controla el consumo y se mide el resultado.

Agua: el nutriente más importante

Lo que muestra la investigación

-26%

de ganancia en novillos que tomaban agua con 3.000-3.900 mg/l de sulfatos (0,46 vs 0,63 kg/día) y 12-15% con polioencefalomalacia

Patterson y col., SDSU 2003

0,5 g/l

de sulfatos ya traban la absorción de cobre; en el Salado ~70% de los terneros tiene deficiencia de cobre

Sager, INTA · INTA Cuenca del Salado-UNLP

3 a 11%

de los pozos del norte bonaerense superan el máximo de sulfatos para ganado (700 mg/l); el promedio ya pasa el de seguridad (300)

Herrero y col., FCV-UBA 2000

«El agua es el nutriente más importante» D. Colombatto

Lo que dice la base (43 modelos con dato)



Agua en cada parcela: solo 20% de los modelos.

Sulfatos en el agua de bebida (orientativo)

- **Menos de 300 mg/l** Sin problema
- **300 a 700 mg/l** Vigilar cobre y diarreas
- **Más de 700 mg/l** Riesgo de menor ganancia y polio

¿Buena para qué? Pedir sulfatos, sales y arsénico en cada aguada, y repetir en sequía, cuando se concentran.

Fertilizar paga, si sube la carga



Paga solo si se cumplen las tres

- 1 Cuando falta pasto**
Otoño y fin de invierno. En primavera el pasto ya sobra: fertilizar ahí no suma carga.
- 2 Subir la carga**
30% más pasto = 30% más animales. Si no se suman animales, el pasto se pasa.
- 3 Comerlo bien**
Parcelas cortas o pastoreo por horas. Sin eso, la mitad del pasto extra se pierde.

Con más animales, el nitrógeno se paga solo. Si no vas a subir la carga, no fertilices.

Capital humano: la palanca que habilita las demás

1

Mismos insumos, distintos resultados

Tuyú socio 3 fertiliza y carga 1,5 cab/ha; Las Flores y Pila 1 producen mucho sin fertilizar

2

La carga es manejo del pasto

Parcelas de 1 a 3 días: mover, leer el pasto y decidir todos los días

3

Las claves las ejecutan personas

Pesar, hacer HPG, suplementar a horario y decidir cuándo encerrar

4

El buen trato produce kilos


Menos estrés en el arreo y la manga: más ganancia y menos enfermedades

Para preguntar

- ¿Quién decide el cambio de parcela y con qué criterio?
- ¿El personal sabe estimar el pasto? ¿Se capacitó?
- ¿Hay incentivos por kg producido o por mortandad?
- ¿Cuánto tiempo recibe la recría frente a la agricultura?

Dos prácticas duplican la carne por hectárea

25% superior de la región: 510



×2

kg de carne por ha, sin cambiar de recurso

1

Energía en invierno

+40 kg por ternero (silo o grano)

2

Pastoreo por horas

mismo pasto, +1 cab/ha

¿Cuánto podemos mejorar cada modelo?


Modelo	Hoy	Palanca principal	Lo que muestra la bibliografía	Potencial
1 • Extensivo	1,8 cab/ha • ~200 kg/ha	Mejorar el pasto	Pasturas en el Salado: carga ×4	270-350
2 • Raigrás	3 cab/ha • 0,41 kg/d • 240 kg/ha	Energía en invierno y pastoreo por horas	Con silo en invierno: 0,19 → 0,64 kg/día (INTA)	360-480
3 • Silaje	3,6 cab/ha • 0,64 kg/d • 506 kg/ha	Alargar la recría y ajustar la carga	Caso Lezama: 3,6 cab/ha, 0,67 kg/día, 652 kg/ha	~650
4 • Grano	4 cab/ha • 0,81 kg/d • 494 kg/ha	Subir la carga	Recría de compra CREA Sudeste: 700 kg/ha con silo	~620
Región	2,9 cab/ha • 0,55 kg/d • 358 kg/ha	Carga y bache invernal	25% superior: 510 • CEI Chascomús: 560	510-700

Potencial en kg de carne/ha con los mismos días de recría. Orden de magnitud, no presupuesto.

Primero la carga y el bache de invierno; después, más kilos por cabeza para que el margen acompañe.

Intensificar: carga, producción y margen

Margen bruto (USD/ha, sin alquiler)




	Pastura	Verdeo + grano	Verdeo + silo
Carga (cab/ha)	2,5	3,5	5
Duración (días)	275	198	198
Carne (kg/ha)	300	420	600
Costo (USD/kg)	1,13	1,16	1,04
Rentabilidad anual	22%	31%	35%
Renta del capital extra	–	15%	19%

Insumos baratos medidos en ternero: 1 ha de silo = 141 kg (antes 500); 1 ha de pastura = 65 kg (antes 257).

Duplicar la carga duplica la carne y el margen. El costo por kg casi no cambia: lo que cambia es cuántos kg se hacen por ha.

Cargar más pide capital

por ha, inmovilizados durante la recría



Duplicar la carga duplica el capital: muchas veces el límite no es el pasto, es la plata.

1 Capitalización

Un tercero pone la hacienda y se reparten los kilos. CREA Sudeste: TIR 13% con USD 45.000 de inversión

2

Hotelería o pastaje

Se cobra por kilo ganado o por día; el campo aporta pasto y manejo

3

Mezclar y escalonar

Parte propia y parte capitalizada; compras y ventas escalonadas

Ganar plata es hacer kilos baratos por animal

Más carga no alcanza

Tres modelos de CREA Maipú, mismos precios

Kg/ha

B  **375** 2,5 cab/ha • 150 kg/cab

A  **480** 4 cab/ha • 120 kg/cab

Margen USD/ha

B  **313**

A  **16**

Kilos baratos sí

Caso real de CREA Lezama: recría de compra con silo

650

kg/ha

3,5 cab/ha • 180 kg/cab

0,50

USD cuesta el kilo

silo a USD 25/t; 500 cab/persona

2,39

USD vale el kilo

compra a 4,50, vende a 3,50

Cada kilo tiene que valer más de lo que cuesta: más kilos por animal y a bajo costo, no solo más cabezas.

¿Contra qué compite la recría en cada lote?



La recría tiene que ganarle al margen del cultivo que desplaza • o al alquiler, si el lote no es agrícola

Verdeos en la rotación agrícola



Volear no le saca lote a la agricultura y se paga solo: en Rauch, la avena sobre maíz tardío dio 600 a 1.400 kg MS/ha con USD 45-80/ha de semilla y voleo (CREA Rauch-Udaquiola, 2024).

La recria más profesional del Sudeste



Cinco escalones: cada uno se apoya en el anterior. Sin medir, no se sabe dónde está la brecha.

Preguntas para enriquecer el diagnóstico

1

¿Qué carga real sostiene tu recría en invierno y qué la limita?

2

¿Pesás? ¿Sabés cuánto gana tu recría en invierno y cuánto en primavera?

3

¿Con qué peso y edad se desteta? ¿Qué tan parejo sale el lote: cuánta cola queda?

4

El suplemento que das, ¿te suma carga o ganancia por animal?

5

¿Usás autoconsumo con limitador? ¿Cuánto consumen y cuánto ganan en invierno?

6

¿Tenés corral? ¿Te anima a cargar más sabiendo que podés encerrar?

7

¿Tu recría compite con un cultivo? ¿Le gana a ese margen?

8

¿Qué te frena para subir un escalón: forraje, instalaciones, capital o gente?

Lo que sigue

1

Separar la recría

Para cerrar la brecha, primero hay que poder verla: kilos, superficie y cabezas propios de la recría

2

Medir

Ganancia por animal, carga real y días de recría. La caravana electrónica, obligatoria desde 2026, lo facilita

3

Completar

Base común en línea: confirmar los casos y las superficies, sumar empresas y cargar ganancia por estación, destete y sanidad


4

Sumar números

Costo por kg, kg de ración por kg y margen por ha con y sin alquiler, con precios comunes

Tendencia regional: alargar la recría para encerrar más pesado. La recría pesa cada vez más en el negocio.

Para cambiar la recría hacen falta las cinco



Fuente: adaptado de V. Gallardo (CREA) en base a Knoster, T. Villa (2000).

Fuentes

- Relevamiento a asesores CREA Región Sudeste y base común de recría (oct-2026).
- CREA Maipú: modelos de recría (ago-2025). Planilla de márgenes de recría en USD (oct-2026). Resultado real invernada CREA Río Salado.
- Pasman, N. y equipo (2025). «Ganadería: ¿qué modelo rinde más?». CREA Región Sudeste.
- CREA Área Ganadería, Botham, L. (2025). «Ganadería argentina: evolución de los diferentes modelos de negocio».
- INTA EEA Cuenca del Salado (2026). «Tecnología para potenciar la recría en campos de cría». Jornada CREA Lezama.
- Bailleres, M. y Pieroni (2020). Recría en Cuenca del Salado. CEI Chascomús, INTA.
- de Laferrere, C. (2026). Suplementación con silo de maíz a campo sobre la ganancia de terneros. UCA.
- Fernández Mayer, A. (2018). Restricción nutricional de bovinos durante el otoño-invierno. INTA Bordenave.
- Colombatto, D. (2025). «Manejo de un feedlot: eficiencia tranqueras adentro». FAUBA. Jornada CREA Lezama.
- Rosenstein, L. (2013, 2014). Pasturas en el Salado; «Vuelta a la recría» (Riffel, Tapalqué). La Nación; Revista Chacra.
- IPCVA (2011). Ganadería y Compromiso 36: La Dolores, Azul. Comisión de Ganadería Litoral Sur: Manual de buenas prácticas de recría.
- INTA Cuenca del Salado (may-2026). Ciclo de charlas, Las Armas: Otondo, Bailleres y Andersen; Maresca; Rodríguez; López Valiente; Larrea, Garelló y Cicchino; Unger.
- INIA Uruguay (2024). Ficha técnica 09: Recría de terneras. INTA Cuenca del Salado-CEI Chascomús (Infocampo, jun-2020): encierre de terneros livianos.
- Gallardo, V. (CREA), adaptado de Knoster y Villa (2000): gestión de cambios complejos.
- Exportaciones de carne vacuna 2026: Gobierno nacional (jun-2026) y El Litoral (jun-2026). Precios: urea, maíz y dólar (oct-2026).